

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 22-4-70 050216

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC
(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

Boîte Postale 1078 - 34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs
N° II5 - AVRIL 1970/I2
2° supplément

PECHERS

PUCERON VERT -

Le puceron vert du pêcher fait preuve déjà d'une grande agressivité. Les pullulations sont plus ou moins importantes selon que le traitement d'hiver a été réussi ou non.

Il convient donc de surveiller très attentivement les vergers et d'intervenir si nécessaire.

Les aphicides utilisés seront de préférence : le Lindane, l'Oxydéméton-méthyl, l'Isolane et le Pirimicarb. Ce dernier devrait être réservé pour le cas où les attaques sont très importantes (feuilles crispées et décolorées).

POMMIERS

ACARIENS - TAVELURE - OIDIUM -

Les éclosions d'araignées rouges (*Panonychus ulmi*) ont débuté depuis longtemps. Avec le retour des températures élevées ces éclosions sont actuellement importantes. Néanmoins les populations varient d'un verger à l'autre et sont fonction de traitements appliqués jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons donc que recommander aux arboriculteurs de surveiller les arbres (bouquets de feuilles situés à proximité des troncs et charpentières) avant d'intervenir aveuglément : on doit observer six à dix acariens par feuille pour appliquer un acaricide.

Signalons que les risques de Tavelure persistent. La lutte contre l'Oïdium ne doit pas être relâchée.

Recommandation :

Le pommier est actuellement en floraison. En cas d'intervention le pesticide doit être inoffensif à l'égard des abeilles.

M. BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 20 Avril 1970